



Midede istenmeyen yabancı misafir: Gastroduodenal tenya


Unwelcome guest in the stomach: The gastroduodenal tapeworm

Mustafa HARI, Nevin AKÇAER ÖZTÜRK, Duran Deha ÇETİN,
Banu KARA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adana

Taeniyazis, kötü hijyen koşulları, çiğ veya yetersiz pişirilmiş et tüketimi ile tarım ve hayvancılıkla ilişkili bölgelerde endemik olan zoonotik bir enfeksiyondur. Klasik taeniyaziste erişkin parazitler ince bağırsağın jejunum ve ileum segmentlerinde lokalize olur. Mide veya duodenum yerleşimi nadir olup, gastrik atrofi gibi nedenlere bağlı mide asidinin azaldığı durumlarda duodenum ve mideye göç ederek endoskopi sırasında doğrudan görülebilir. Olgumuz 85 yaş medikal tedaviye dirençli peptik

yakınma, bulantı, kabızlık ile başvurmuştu. Yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide antrumdan başlayıp duodenuma distale kadar uzandığı görülen hareketli taeniyazise ait görünüm izlendi (Resim 1). Tekrarlayan çoklu denemelere rağmen taeniyazisin distalde nereye kadar uzanım gösterdiği bilinmemesi ve çok uzun olması üzerine çıkarılmadı. Medikal tedavi verilen hastanın yakınmalarının 3 ay sonra tamamen gerilediği izlendi.



Resim 1 Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde, duodenum ve mideye kadar uzanan şerit şeklinde, gastroduodenal taeniyazis ile uyumlu parazit görüntüsü (A, B. Duodenum; C, D. Mide).