

Yazarın cevabı

Selim AYDEMİR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü, Zonguldak

Gastroenteroloji polikliniklerine dispeptik şikayetlerle çok fazla sayıda hasta başvurmaktadır. Bu hastaların çoğu daha önce farklı merkezlere başvurarak değişik tedaviler aldıklarını anamnezlerinde belirtmektedirler.

Ayrıca sorulduğunda bu hastaların bir kısmı daha önce midesinde mikrobik gastrit olduğu söyleyerek antibiyotik tedavisi aldıklarını ifade etmektedirler. Bu hastaların büyük çoğunluğu *H.pylori* için aldıkları ilaçların isimlerini ve tedavinin içeriğini bilmemektedirler. Bu çalışmanın amacı *H.pylori* tedavisinde kullanılan tedavi rejimlerinin

başarı oranlarını saptamak değil, dispeptik şikayetlerle başvuran ve anamnezlerinde daha önce *H.pylori* için tedavi almış hastalarda yaklaşımımızın nasıl olacağıdır. Bu çalışma göstermiştir ki bölgemizde *H.pylori* için tedavi almış dispeptik hastaların çoğunda *H.pylorinin* halen pozitif olduğuudur. Bunun nedeni; etkinliği düşük ilaç kombinasyonları, yetersiz süre kullanımı, düşük doz kullanım, antibiyotik direnci, reenfeksiyon olabilir. Bundan sora yapılması gereken ise bu duruma sebep olan sorun veya sorunların araştırılması ve düzeltilmesi yönünde yapılması gerekenlerin saptanmasıdır.